

	<p>Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto AULSS 8 BERICA – OSPEDALE S. BORTOLO Via Rodolfi 37, I-36100 Vicenza</p> <p>U.O.C. MICROBIOLOGIA DI VICENZA Dipartimento Strutturale della Diagnostica</p> <p>Direttore: Dr. Mario Rassu</p>
	<p>IOAMB0001 ISTRUZIONI PER I PRELIEVI MICROBIOLOGICI DELL'APPARATO GENITALE FEMMINILE</p>

REDATTO DA	VERIFICATO DA	PUBBLICATO DA
Manuela Pegoraro	Mario Rassu	Manuela Pegoraro

Revisione N. 0 del 06/06/2023

Presso l'ambulatorio dell'UOC Microbiologia di Vicenza vengono eseguiti:

- **tampone vaginale:** indicato per la diagnosi eziologica di vaginite; prevede la ricerca di batteri e miceti
- **tampone vagino-rettale** mirato alla ricerca di *Streptococcus agalactiae* (gruppo B): indicato nelle donne a termine di gravidanza per il controllo dell'eventuale colonizzazione
- **tampone cervicale:** indicato per la diagnosi di malattia sessualmente trasmessa. Il metodo molecolare in uso prevede la ricerca di: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Trichomonas vaginalis*. Esso non permette l'esecuzione dell'antibiogramma nei confronti di *N. gonorrhoeae*: per quest'ultimo è necessario richiedere la ricerca colturale di *N. gonorrhoeae*. In gravidanza, la ricerca dei patogeni indicati, viene eseguita tramite tampone vaginale.
- la ricerca di **Papillomavirus (HPV)** prevede lo screening dei genotipi ad alto rischio ed è indicata come approfondimento diagnostico dopo il riscontro di positività al PAP test. Si raccomanda di portare i risultati dei PAP test eseguiti.

Si raccomanda di:

- evitare l'utilizzo di lavande vaginali nel giorno precedente
- evitare l'assunzione di antibiotici/antimicotici per via orale e/o topica (ovuli e/o creme) nei 7 giorni precedenti
- astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti
- attendere 3-4 giorni dopo la fine delle mestruazioni prima di eseguire il prelievo

- **tampone uretrale:** può essere di ausilio diagnostico nei quadri sintomatologici riferibili a cistite con urocoltura negativa. Può essere richiesto anche per la ricerca dei patogeni a trasmissione sessuale (vedi "tampone cervicale").

Si raccomanda di:

- evitare l'assunzione di antibiotici/antimicotici almeno nei 7 giorni precedenti
- non urinare nelle 3 ore precedenti l'esecuzione dell'esame

- la ricerca di **Herpes Simplex Virus (HSV 1-2)** prevede la raccolta del liquido delle vescicole o, in assenza di vescicole integre, del materiale presente sul fondo di ulcere recenti. La richiesta di ricerca HSV 1-2 va specificata. Si raccomanda di non applicare creme antivirali nei 2 giorni precedenti l'esecuzione dell'esame.

I prelievi vengono eseguiti presso l'Ambulatorio dell'UOC di Microbiologia da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 9.45. L'accesso è su prenotazione, telefonando al numero 0444-753621 (Segreteria del Laboratorio) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00. Il lunedì è riservato ai tamponi vagino-rettali nelle donne in gravidanza.