



## RACCOLTA delle URINE delle 24 ORE CON SODIO CARBONATO

Per il dosaggio di **PORFIRINE TOTALI, UROPORFIRINE,  
COPROPORFIRINE**

Gentile Signore/a,

le è stato consegnato un bidoncino per la raccolta delle urine delle 24 ore e un contenitore (o bustina) di SODIO CARBONATO in polvere.

Si deve iniziare (ad esempio alle ore 6 del primo giorno) svuotando la vescica senza raccogliere le urine.

Da quel momento in poi, fino alla stessa ora del giorno dopo (ad esempio alle ore 6 del secondo giorno) **TUTTA** l'urina deve essere raccolta dentro il bidoncino.

Si deve versare il contenuto del contenitore (o bustina) di Sodio Carbonato nel bidoncino attraverso l'apertura grande subito dopo la prima minzione.

Se per qualunque motivo una certa quantità di urina venisse persa, la raccolta deve essere ripetuta.

Conservare il bidoncino tappato in un luogo fresco e tenere al riparo dalla luce.

### SODIO CARBONATO: PRIMI SOCCORSI

<b>Indicazioni di pericolo</b>	Provoca grave irritazione oculare.
<b>Occhi</b>	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un Medico.